

БАКТОКС 125 мг/5 мл

Амоксициллин

250 мг/5 мл

500 мг/5 мл

LABORATOIRE
Innotech
INTERNATIONAL

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

- Внимательно прочтайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/ использование этого препарата.
- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
- Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Это лекарство назначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.
- Если в период лечения симптомы заболевания усилились и ваше состояние ухудшилось или появились другие симптомы, немедленно обратитесь к врачу или фармацевту.
- Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Состав**Бактекс 125 мг /5 мл:**

в 5 мл приготовленной суспензии (1 мерная ложка) содержится:
амоксициллина 125 мг (в форме тригидрата).

Бактекс 250 мг/5 мл:

в 5 мл приготовленной суспензии (1 мерная ложка) содержится:
амоксициллина 250 мг (в форме тригидрата).

Бактекс 500 мг/5 мл:

в 5 мл приготовленной суспензии (1 мерная ложка) содержится:
амоксициллина 500 мг (в форме тригидрата).

Вспомогательные вещества:

лимонная кислота безводная, тринатрия цитрат безводный, натрия* бензоат, тальк, гуаровая камедь, ароматизаторы: лимонный, апельсиновый и персико-абрикосовый, аспартам*, кремния диоксид.

*Данный препарат содержит аспартам и натрий (6,26 мг на мерную ложку).

Фармакотерапевтическая группа

Антибиотик из семейства бета-лактаминов группы аминопенициллинов.

Код ATХ: J01CA04

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату возбудителями:

- инфекции органов дыхания;
- инфекции органов мочеполовой системы;
- инфекции органов желудочно-кишечного тракта;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- болезнь Лайма (боррелиоз);
- эрадикация Helicobacter pylori в комбинации с другими антимикробными препаратами;
- эндокардит (профилактика)

Противопоказания

- Гиперчувствительность (в т.ч. к другим пенициллинам, цефалоспоринам).
- Инфекционный мононуклеоз (риск возникновения побочных явлений кожного характера).

Состорожностью: Аллергические реакции (в т.ч. в анамнезе), инфекционный мононуклеоз, заболевания желудочно-кишечного тракта в анамнезе (особенно колит, связанный с применением антибиотиков), почечная недостаточность, беременность, период лактации, фенилкетонурия (наследственное заболевание, выявленное при рождении) ввиду наличия аспартама.

Беременность и период лактации

В случае необходимости можно применять при беременности.

С осторожностью применять препарат в период лактации (грудного вскармливания). При появлении у новорожденного диареи, кожной сыпи, кандидоза или других симптомов прекратить кормление грудью на время лечения.

Способ применения и дозы

Для приема внутрь.

Данный препарат можно принимать натощак, до, во время и после приема пищи. Режим дозирования устанавливают индивидуально, с учетом тяжести течения заболевания, чувствительности возбудителя к препарату, возраста пациента. Взрослым и детям старше 10 лет (с массой тела более 40 кг) назначают по 500 мг 3 раза в сутки. При тяжелом течении инфекции – по 750 мг – 1 г 3 раза в сутки.

Детям в возрасте:

- от 5 до 10 лет назначают по 250 мг (5 мл суспензии) 3 раза в сутки;
- от 2 до 5 лет - по 125 мг (2,5 мл суспензии) 3 раза в сутки;
- до 2 лет - из расчета 20 мг на кг массы тела, рассчитанную суточную дозу делят на 3 приема. У недоношенных и новорожденных дозу снижают и/или увеличивают интервал между приемами.

Курс лечения 5-12 дней.

Приготовление суспензии:

Наполнить флакон водой до отметки и взболтать до образования однородной жидкости. Перед каждым употреблением суспензию необходимо взбалтывать. Количество порошка во флаконе достаточно для приготовления 60 мл суспензии (12 доз).

При острых инфекциях желудочно-кишечного тракта (паратифи, брюшной тиф) и желчных путей, при гинекологических инфекциях взрослым – 1,5-2,0 г 3 раза в сутки или по 1,0 – 1,5 г 4 раза в сутки.

При лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у взрослых, вызванных Helicobacter pylori, назначают:

- 1 г амоксициллина утром и вечером в комбинации с другими антимикробными препаратами.

При неосложненной острой инфекции мочевых путей у женщин назначают 3 г препарата с большим количеством воды с повторением дозы через 12 ч.

Для лечения острой неосложненной гонореи назначают 3,0 г однократно препарата в комбинации с 1,0 г пробенецида.

При тяжелых инфекциях (менингит, септициемия) назначают до 6,0 г в сутки в 3 - 4 приема.

Для профилактики эндокардита при малых хирургических вмешательствах взрослым – 3 - 4 г за 1 час до проведения процедуры. При необходимости назначают повторную дозу через 8 - 9 часов. Детям дозу уменьшают в два раза.

Пациентам с нарушением функции почек (клиренс креатинина ниже 10 мл/мин) дозу препарата уменьшают на 15-50 % или увеличивают интервал между приемами до 24 час.

Побочное действие

Аллергические реакции: возможны крапивница, гиперемия кожи, эритематозные высыпания, ангина невротический отек, ринит, конъюнктивит;

531475-06-14 / 46153063

редко - лихорадка, артриты, эозинофилия, экскрементивный дерматит, мультиформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона); реакции, сходные с сывороточной болезнью; в единичных случаях - анафилактический шок.

Со стороны пищеварительной системы: дисбактериоз, изменение вкуса, рвота, тошнота, диарея, стоматит, глоссит, умеренное повышение активности «печеночных» трансаминаз, редко - псевдомембранный колит.

Со стороны нервной системы: возбуждение, тревожность, бессонница, атаксия, спутанность сознания, изменение поведения, депрессия, периферическая невропатия, головная боль, головокружение, эпилептические судороги. Лабораторные показатели: лейкопения, нейтропения, тромбоцитопеническая пурпурита, анемия.

Прочие: затрудненное дыхание, тахикардия, интэрстициальный нефрит, кандидомикоз влагалища, суперинфекция (особенно у пациентов с хроническими заболеваниями или пониженной резистентностью организма).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Фармацевтически несовместим с аминогликозидами (во избежание взаимной инактивации нельзя смешивать).

Антациды, глюкозамин, слабительные лекарственные средства, пища, аминогликозиды замедляют и снижают абсорбцию; аскорбиновая кислота повышает абсорбцию.

Бактерицидные антибиотики (в т.ч. аминогликозиды, цефалоспорины, ванкомицин, рифампицин) оказывают синергическое действие; бактериостатические лекарственные средства (макролиды, хлорамфеникол, линкозамиды, тетрациклины, сульфаниламиды) - антагонистическое. Повышает эффективность непрямых антикоагулянтов (подавляя кишечную микрофлору, снижает синтез витамина K и протромбиновый индекс); уменьшает эффективность эстрогенсодержащих пероральных контрацептивов; лекарственные средства, в процессе метаболизма которых образуется парааминобензойная кислота, этинилэстрадиола - риск развития кровотечений «прорыва».

Амоксициллин уменьшает клиренс и повышает токсичность метотрексата; усиливает всасывание дигоксина.

Диуретики, аллопуринол, оксифенбутазон, фенилбутазон, нестероидные противовоспалительные препараты, и другие лекарственные средства, блокирующие канальцевую секрецию, повышают концентрацию амоксициллина в крови. Аллопуринол повышает риск развития кожной сыпи.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, диарея, нарушение водно-электролитного баланса (как следствие рвоты и диареи).

Лечение: промывание желудка, активированный уголь, солевые слабительные, лекарственные средства для поддержания водно-электролитного баланса; гемодиализ.

Особые указания

При курсовом лечении необходимо проводить контроль за состоянием функции органов кроветворения, печени и почек. Возможно развитие суперинфекции за счет роста нечувствительной к нему микрофлоры, что требует соответствующего изменения антибактериальной терапии. При назначении больным с сепсисом возможно развитие реакции бактериолиза (реакция Яриша - Герксгеймера) (редко). У пациентов с повышенной чувствительностью к пенициллином возможны перекрестные аллергические реакции с другими бета-лактамными антибиотиками. При лечении легкой диареи на фоне курсового лечения следует избегать противодиарейных лекарственных средств, снижающих перистальтику кишечника;

можно использовать каolin - или аттапульгитсодержащие противодиарейные лекарственные средства. При тяжелой диарее необходимо обратиться к врачу. Лечение обязательно продолжают еще 48 - 72 ч после исчезновения клинических признаков заболевания.

При одновременном применении эстрогенсодержащих пероральных контрацептивов и амоксициллина следует по возможности использовать другие или дополнительные методы контрацепции.

Форма выпуска

5,1 г (125 мг / 5 мл), 6,6 г (250 мг / 5 мл), 12 г (500 мг / 5 мл) порошка во флаконы коричневого стекла. Один флакон с инструкцией по применению и мерной ложкой в картонной пачке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C. После приготовления суспензию хранить в холодильнике при температуре от +2°C до +8°C не более 14 дней.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Лаборатория Иннотек Интернасиональ

22 авеню Аристид Бриан, 94110 Аркей, Франция

Произведено: Иннотера Шузи

Рю Рене Шантеро, Л'Иль Вер, 41150 Шузи-Сюр-Сис, Франция
www.innotech.ru
e-mail: innotech@innotech.ru

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРО АНТИБИОТИКИ

Антибиотики эффективны в борьбе с вызванных бактериями. Антибиотики не помогают при инфекциях, вызванных вирусами.

Только врач может определить, какой антибиотик нужен при конкретном заболевании.

Неправильный выбор антибиотика, его дозы или продолжительности курса лечения может привести к хроническому течению заболевания, формированию антибиотикорезистентности (нечувствительности, устойчивости) бактерий к конкретному антибиотику.

Вы способствуете появлению резистентных бактерий, задерживаете ваше выздоровление или даже снижаете эффективность этого препарата, если не соблюдаете:

- дозировки
- графика приема
- длительности курса лечения.

Следовательно, чтобы обеспечить эффективность препарата, следует:

- 1) принимать антибиотики только по назначению врача,
- 2) строго соблюдать назначение врача,
- 3) не следует использовать антибиотик повторно без назначения врача, даже если вам кажется, что симптомы вам знакомы,
- 4) категорически запрещается давать ваш антибиотик другим лицам: возможно, он не подходит в случае их заболевания.

Закончив курс лечения, принесите фармацевту все начатые коробки для правильного и надлежащего уничтожения оставшегося препарата.