

Фарматекс

Бүртгэлийн дугаар: F19971215GP00196

Худалдааны нэршил: ФАРМАТЕКС

Олон улсын нэршил: Бензалконийн хлорид

Эмийн хэлбэр: Үтрээний лаа

Найрлага: 1 лаанд агуулагдах хэмжээ (1.6г):

Үйлчлэгч бодис:

Бензалконийн хлоридийн 50%-ийн усан уусмал ... 37.8мг

Бензалконийн хлоридтой тэнцэх 18.9мг

Туслах бодис:

Гипролоза 9.1мг

Хатуу тос “Witespol S 51” 1553,1мг

Гадаад байдал: Конус маягийн үзүүртэй, цагаан өнгийн, цилиндр хэлбэртэй лаа.

Эмийн эмчилгээний бүлэг: Жирэмслэлтээс хамгаалах хэсэг газрын үйлчилгээтэй эмийн бэлдмэл

АТС код: G02BB

Эм судлалын онцлог: Бензалконийн хлорид нь спермицид болон антисептик үйлчилгээг нэгэн зэрэг үзүүлдэг. Үйлчлэгч бодис нь эр бэлгийн эсийн мембраныг (эхлээд сүүл хэсгийг дараа нь толгой хэсгийг) гэмтэснээр үр тогтоох чадваргүй болгодог. Үтрээнд лааг хийснээс хойш 5 минутын дараа эмчилгээний үйлдэл эхлэнэ.

Фармакекийг хэрэглэснээр жирэмслэх эрсдэлийг нилээд хэмжээгээр бууруулах боловч энэ эрсдэлийг бүрэн арилгадаггүй байна. Үтрээний хэвийн бичил орчинг өөрчилдөггүй (Додерляная савханцар). Фарматекс сарын тэмдгийн мөчлөгт нөлөө үзүүлэхгүй.

In vitro бэлдмэл нь бэлгийн замаар дамжих халдваруудын олон төрлийн үүсгэгч тэр дундаа гонококк, хламид, герпес вирусын 2-р хэлбэр, хүний дархлал хомсдолын вирус, үтрээний трихомонад, алтлаг стафилакоккийн эсрэг үр дүнтэй.

Бэлдмэл нь микоплазмд үйлчлэхгүй ба Gardnerella vaginalis, candida albicans, Haemophilus ducrey, treponema pallidum-д сул үйлчилгээ үзүүлнэ.

Фармакокинетики: Бензалконийн хлорид нь үтрээний салстаар маш багаар шимэгдэнэ. Үтрээний ханын гадаргуу дээр шингэх ба ердийн физиологийн ялгадасын хамт гадагшилна. Мөн усаар угааж болно.

Хэрэглэх заалт: Нөхөн үржихүйн насны хэсэг газрын үйлчилгээтэй жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэл юм. Дараах тохиолдлуудад хэрэглэж болно:

- Жирэмслэлтээс хамгаалах эм уух эсвэл умайд ерөндөг тавиулах боломжгүй
- Хүүхэд төрүүлсэний дараа, хөхүүл үед
- Жирэмслэлт тасалсаны дараа
- Цэвэршилтийн урьдал насны хүмүүст
- Тогтмол бус жирэмслэлтээс хамгаалах шаардлагатай тохиолдолд
- Жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэл байнга уудаг хүмүүс завсарлах болон эмээ мартсан үед
- Үтрээний халхавч болон умайн ерөндөг хэрэглэж байгаа эмэгтэйчүүд стероид бус үрэвслийн эсрэг эм бэлдмэл хэрэглсэн тохиолдолд нэмэлтээр жирэмслэхээс хамгаалах зорилгоор хэсэг газрын үйлдэлтэй бэлдмэлийг хэрэглэж болно.

Хориглох заалт:

- Эмийн найрлагад орсон аль нэг бодист хэт мэдрэг үед
- Үтрээний үрэвсэлтэй бол
- Умай болон үтрээний салстын цочирсон болон шархалсан үед хэрэглэхгүй.

Жирэмсэн болон хөхүүл үед:

Жирэмсэн үед хэрэглэхэд ямар нэг хортой нөлөө илрээгүй байна. Үйлчлэгч бодис болон түүний эцсийн бүтээгдэхүүн урагт сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй гэдэг нь туршилтаар нотолсон.

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri
_____E.M.Ağayev
“_08_” oktyabr_2018-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

FARMATEKS vaginal suppozitoriyalar

FARMATEX

Бeyнəлxəлq patеntлəşdirilməmiş adı: Benzalconium chloride

Tərkibi

Təsis edici maddə: 1 suppozitoriyanın tərkibində 37,8 mq benzalconium xloridin 50%- li sulu məhlulu (18,9 mq benzalconium xloridə müvafiqdir) vardır.

Köməqçi maddələr: hidrokspipropilsellüloza, bərk piy “Witespol S 51”.

Təsviri

Xarakterik iyli, konusabənzər ucluğa malik silindrik formalı, ağ rəngli suppozitoriyadır.

Farmakoterapektiv qrupu

Yerli istifadə üçün kontraseptiv vasitə.

АТС kodu: G02BB.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Benzalconium xlorid eyni vaxtda həm spermisid və həm də antiseptik təsir göstərir. Spermisid təsiri, təsiredici maddənin spermatozoidlərin membranına dağıcı təsiri ilə izah olunur. Spermatozoidlərin məhv olması 2 mərhələdə gedir: əvvəl quyuq, daha sonra isə başlıq parçalanır ki, bu da yumurta hüceyrənin zədələnməsi spermatozoidlə mayalanmasını qeyri-mümkün edir. Effekt suppozitoriyanın uşaqlıq yoluna yeridilməsindən 5 dəqiqə sonra yaranır. Farmateks preparatının qəbulu hamiləliyin yaranma riskini azaldır, lakin hamiləliyi tam ləğv etmir.

Uşaqlıq yolunun normal mikroflorasına təsir etmir (eləcə də Doderleyn çubuğuna). Farmateks menstrual siklə, libidoya və fertilliyə təsir etmir.

İn vitro benzalconium xlorid *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia spp.*, *Trichomonas vaginalis*, *Herpes simplex (tip2)*, *Staphylococcus aureus* törədicilərinə münasibətdə aktivdir. *Mycoplasma spp.* –yə təsir etmir və *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans*, *Haemophilus ducreyi*, *Treponema pallidum*-a zəif təsir göstərir.

Farmakokinetikası

Benzalconium xloridin uşaqlıq yolunun selikli qişasından absorbsiyası çox aşağıdır. Selikli qişanın səthindən preparat adı su ilə yuyunma zamanı və normal fizioloji ifrazatlarla xaric olur.

İstifadəsinə göstərişlər

Reproduktiv yaşda olan qadınlar üçün yerli kontrasepsiya, əsasən də:

- hormonal kontraseptivlərin yaxud uşaqlıqdaxili kontrasepsiyanın istifadəsinə əks göstərişlər artıqdıq;

Хөхүүл үед: Энэхүү спермицид нь хөхний сүү болон цусанд нэвтэрдэггүй гэдэг нь баглагдсан тул хөхүүл үед хэрэглэхэд аюулгүй.

Хэрэглэх арга, тун:

Үтрээнд хийж хэрэглэнэ. Бэлгийн харьцаанд орохоос 5 минутын өмнө хэвтээ байрлалд үтрээнд лааг гүн хийнэ. Бэлдмэлийн үйлчлэх хугацаа 4 цаг. Давтан бэлгийн харьцаанд орох бүрдээ лааг шинээр хийнэ.

Гаж нөлөө: Бэлдмэлийн найрлага дахь бодист харшлах / хорсох, загатнах/, контактный дерматит илэрч болзошгүй. Эдгээр шинжүүд илэрвэл фармакекийг хэрэглэхээ зогсооно. Хэрэв эмийн зааварт тусгагдаагүй гаж нөлөө илэрвэл эмчид хандана уу.

Тун хэтрэлт: Тун хэтэрсэн шинж тэмдэглэгдээгүй.

Бусад эмийн бэлдмэлтэй харилцан нөлөөлөл: Үтрээгээр хэрэглэдэг эм бэлдмэлтэй хамт хэрэглэвэл Фармакекийн эр бэлгийн эс үхүүлэх үйлчилгээг идэвхигүй болгоно.

Үйлчлэгч бодис бензалконийн хлорид нь саванд идэвхээ алддаг учир бэлгийн харьцааны өмнө болон хойно үтрээгээ савангаар угаахгүй байх шаардлагатай.

Анхааруулга: Жирэмслэхээс хамгаалах үйлдлийн үр дүн нь хэрэглэх зааврыг зөв мөрдөхөөс хамаарна.

- Бэлгийн харьцаанд орохын 2 цагийн өмнө мөн түүнээс хойш 2 цагийн турш бэлэг эрхтэнээ савангаар угаахыг хориглоно, учир нь бага хэмжээний савангийн үлдэгдэл ч Фармакекийн үйлчлэгч бодисыг идэвхигүйжүүлнэ.

- Фармакекийг үтрээнд хийсэн үед ванн, нуур далайн ус, бассейн, усан санд орж болохгүй бөгөөд жирэмслэхээс хамгаалах үйлчилгээг бууруулах аюултай.

- Бэлгийн харьцаа болгоны өмнө хэрэглэнэ.

- Лааг үтрээнд аль болох гүн оруулах хэрэгтэй бөгөөд үүний тулд хэвтээ байрлал илүү тохиромжтой.

- Давтан бэлгийн харьцаа бүрийн өмнө шинэ лаа заавал хэрэглэнэ.

- Бэлгийн харьцааны дараа зөвхөн цэвэр усаар эсвэл Фармакекийн саван агуулаагүй, бензалконийн хлорид бүхий хөөсөрдөг уусмалаар бэлэг эрхтэний гадна талыг угаана. Бэлгийн харьцаанаас хойш 2 цагийн дараа үтрээгээ угааж болно.

- Үтрээний өвчнийг эмчлэх ба/эсвэл үтрээгээр эм бэлдмэл хэрэглэх шаардлагатай тохиолдолд эмчилгээ дууссаны дараа Фармакекийг хэрэглэнэ.

Эмийн савлалт: Бага нягтрал бүхий полиэтилен бүрхүүлтэй, поливинилхлоридон хальсаар хийсэн хавтгайд 5лаа байх ба 5 лаа бүхий нэг эсвэл хоёр хавтгай хэрэглэх зааврын хамт цаасан хайрцаганд савлагдсан.

Хадгалах нөхцөл: 25°С-аас ихгүй хэмд хүүхэд хүрэхгүй газар хадгална.

Хадгалах хугацаа: 3 жил. Хайрцган дээр заасан хугацаа хэтэрсэн бол хэрэглэхгүй.

ЭМИЙН САНГААС ЖОРГУЙ ОЛГОНО.

Бүртгэлийн гэрчилгээг эзэмшигч хуулийн этгээд

Олон Улсын Иннотек Лаборатори

22, авеню Аристид Бриан, 94110 Аркей, Франц

Үйлдвэрлэлэгчийн хаяг

Эмийн эцсийн бүтээгдэхүүн, сав, баглаа боодлын үйлдвэрлэгч

1. Иннотера Шузи

Рю Рене Шантеро, Шузи-сюр-Сис, Валуар-сюр-Сис, 41150, Франц

2. Юнигер Ликвид Мануфэксчуринг

1-3 алле де ля Нест, промышленная зона Ан-Сигал 31770 Коломбе, Франц

Чанарын хариуцлага хүлээгч

Иннотера Шузи

Рю Рене Шантеро, Шузи-сюр-Сис, Валуар-сюр-Сис, 41150, Франц

- doğuşdan sonrakı dövrdə, laktasiya dövründə; hamiləliyin pozulmasından sonra;

- menopauzaya yaxın dövrdə;

- qeyri-müntəzəm cinsi əlaqələr zamanı;

- əlavə təyin olunmuş yerli kontrasepsiya məqsədilə vaginal diafraqma, servikal qapaq, ya-xud digər uşaqlıqdaxili kontraseptivlərin, əsasən də QSIƏP-in (qeyri-zamanlı ilühabəleyhina preparatlar) uzunmüddətli qəbulu zamanı.

- əlavə təyin olunmuş kontrasepsiya məqsədilə peroral hormonal kontraseptivlərin qəbulu-nun gecikdirilməsi və ya ötürülməsi zamanı. Belə hallarda hər iki kontrasepsiya metodun-dan istifadə etmək məsləhət görlülür (menstrual siklin qalan günlərinə qədər uzadılması).

Əks göstərişlər

Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq, vaginit, uşaqlıq yolunun və uşaqlıq boynunun selikli qişasının xoralanması.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Əgər Farmateks düzgün istifadə edilərsə hamiləlikdən qorunmaq üçün effektiv preparatdır.

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, yerli spermisid kontrasepsiya metodu həmişə hormonal kontra-sepsiya, uşaqlıqdaxili kontraseptivlər, diafraqma, servikal qapaq yaxud prezervativlə müqayisədə daha az effektivdir.

Cinsi akta 2 saat qalmış və ondan 2 saat sonra cinsiyyət orqanlarını sabun ilə yumaq qadağandır, belə ki sabun Farmateks preparatının təsiredici maddəsini dağır.

Xarici cinsiyyət orqanlarının yuyulması hər iki cinsi tərəfdaş üçün yalnız adı su ilə həyata keçirilməlidir. Uşaqlıq yolunun şırıncı ilə yuyulması cinsi aktdan 2 saat sonra olmalıdır.

Uşaqlıq yoluna yeridilmiş Farmateks preparatının kontraseptiv təsirini azaltmamaq üçün vanna qəbul etmək, dənizdə, su hovuzlarında çimmək olmaz.

Vacib hallarda vaginal istifadə üçün preparatlarla müalicədə müalicə kursunun sonunadək Farmateks preparatının istifadəsinə müvəqqəti dayandırmaq lazımdır.

Bu kontrasepsiya metodu insanı immunçatışmazlığı virusu ilə yoluxmadan və cinsi yolla ötürülən infeksiyalardan qorumur. Bu xəstəliklərdən qorunmaq üçün baryer kontrasepsiya metodu-pre-zervativdən istifadə olunur.

Digər dərman vasitələrinə qarşılıqlı təsiri

İntravaginal istifadə olunan istənilən vasitə preparatın spermisid təsirini azalda bilər. Təsiredici maddə - benzalconium xlorid sabunun təsiri ilə dağılır, ona görə də sabunun hətta az miqdarda belə cinsiyyət orqanlarını yumaq üçün istifadəsi məsləhət görlülür.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik

Preparat kontraseptiv olduğundan hamiləlik vaxtı qəbul edilmir.

Hamiləliyin erkən vaxtlarında bu spermisidin təsadüfi qəbulu zamanı dölə hər hansı bir mənfi təsir müşahidə edilməmişdir.

Laktasiya

Ana südünə zəif nüfuz edir və mənfi nəticələr müşahidə olunmur. Preparat laktasiya dövründə istifadə oluna bilər.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparatın nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə mənfi təsiri barədə heç bir məlumat yoxdur.

İstifadə qaydası və dozası

Vaginal istifadə üçündür.

Suppozitoriya cinsi akta 5 dəqiqə qalmış arxası üstə uzanmış vəziyyətdə uşaqlıq yoluna (dərinə) yeridilir. Preparatın təsir müddəti 4 saatdır. Hər bir təkrar cinsi əlaqədən öncə mütləq yeni suppo-zitoriya yeridilməlidir.

Əlavə təsirləri

Allergik reaksiyalar, kontakt dermatit, uşaqlıq yolunun yaxud cinsi tərəfdaşın cinsi orqanının qaşınma və yanma (göynəmə) hissi, ağrılı sidik ifrazı.

Bu təzahürlərin meydana çıxması zamanı Farmateks preparatının qəbulunu dayandırmaq lazımdır.

Təlimatda göstərilən əlavə effektlərdən hər hansı biri dərinləşərsə, yaxud təlimatda göstəril-məyən hər hansı əlavə effektlər meydana çıxarsa həkimə məlumat verin.

Doza həddinin aşılması

Doza həddinin aşılması halları qeydə alınmayıb.

Buraxılış forması

Vaginal suppozitoriyalar.

5 suppozitoriya, aşağısıxlıqlı polietilənlə örtülmüş stripdə.

1 və ya 2 strip içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25° C-dən aşağı temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Əgər suppozitoriya istidən əriyərsə, dərhal soyuducuya qoymaq, yaxud soyuq su şırnağının altında iti ucu aşağı olmaqla yerləşdirmək lazımdır, suppozitoriya əvvəlki formasını alacaq; belə olan halda preparatın tərkibi dəyişməyəcək.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для
медицинского применения

ФАРМАТЕКС

Регистрационный номер: П N011489/01

Торговое название: ФАРМАТЕКС

МНН: Бензалкония хлорид

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные

Состав на 1 суппозиторий (1,6 г):

Действующее вещество:

Бензалкония хлорид 50 % водный раствор..... 37,8 мг,

что соответствует бензалконию хлориду.....18,9 мг

Вспомогательные вещества:

Гипролоза.....9,1 мг

жир твердый Witepsol S 51 1553,1 мг

Описание

Суппозитории белого цвета, цилиндрической формы с конусообразным концом.

Фармакотерапевтическая группа

Контрацептивное средство для местного применения.

Код АТХ: G02BB

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Бензалкония хлорид является одновременно спермицидом и антисептиком. Спермицидное действие обусловлено способностью действующего вещества разрушать мембраны сперматозондов (сначала жгутиков, затем головок), что приводит к невозможности оплодотворения яйцеклетки поврежденным сперматозоидом.

Эффект развивается через 5 мин после введения суппозитория во влагалище.

Применение препарата Фарматекс значительно снижает риск возникновения беременности, однако не устраняет его полностью.

Не влияет на нормальную микрофлору влагалища (в т.ч. на палочку Додерляйна).

Фарматекс не влияет на менструальный цикл, либидо и фертильность.

In vitro бензалкония хлорид активен в отношении *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia spp.*, *Trichomonas vaginalis*, *Herpes simplex* тип 2, *Staphylococcus aureus*. Не оказывает действия на *Mycoplasma spp.* и слабо действует на *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans*, *Haemophilus ducreyi* и *Treponema pallidum*.

Фармакокинетика

Абсорбция бензалкония хлорида слизистой оболочкой влагалища очень низка. С поверхности слизистой оболочки препарат удаляется простым промыванием водой и с нормальными физиологическими выделениями.

Показания к применению

Местная контрацепция для женщин репродуктивного возраста, и особенно:

- при наличии противопоказаний к применению гормональных контрацептивов или внутриматочной контрацепции;

- в послеродовом периоде, в период грудного вскармливания; после прерывания беременности;

- при пременопаузе;

- при нерегулярных половых контактах;

- в качестве дополнительной местной контрацепции при использовании вагинальной диафрагмы, цервикального колпачка или других внутриматочных контрацептивов, особенно при длительном применении лекарственных препаратов, таких как НПВС (нестероидные противовоспалительные средства).

- в качестве дополнительного метода контрацепции при пропуске или опоздании в приеме пероральных гормональных контрацептивов. В этом случае рекомендуется сочетать оба метода контрацепции на протяжении оставшихся дней менструального цикла.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, вагинит, изъязвление и раздражение слизистой оболочки влагалища и шейки матки.

Беременность и период грудного вскармливания

Беременность

Препарат является контрацептивом, во время беременности не применяется.

При случайном применении этого спермицида на ранних сроках беременности не было выявлено какого-либо отрицательного воздействия на плод.

Грудное вскармливание

Проникновение в материнское молоко возможно в крайне незначительном количестве без каких-либо известных негативных последствий. Препарат может применяться в период грудного вскармливания.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

İstehsal sahələri/Hazır dərman formasının istehsalı, qablaşdırılması

İnnotera Şuzi.

Ryu Rene Şantero, Şuzi-Sür-Sis, Valuar-sür-Sis, 41150, Fransa.

Yuniter Likvid Manufekçuring.

1-3 alle de Iya Nest, sənaye sahəsi An-Siqal 31770 Kolomye, Fransa.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

İnnotek İnternasional Laboratoriyası.

22, avenue Aristid Brian, 94110 Arkey, Fransa.

Keyfiyyət nəzarət

İnnotera Şuzi.

Ryu Rene Şantero, Şuzi-Sür-Sis, Valuar-sür-Sis, 41150, Fransa.

Способ применения и дозы

Для вагинального применения.

Лежа на спине, суппозиторий вводят глубоко во влагалище за 5 минут до полового акта. Длительность действия – 4 часа. Обязательно вводить новый суппозиторий перед каждым повторным половым актом.

Побочное действие

Аллергические реакции, контактный дерматит, зуд и жжение во влагалище и/или половом члене партнера, болезненное мочеиспускание.

В случае их возникновения прекратить использование Фарматекса.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки не отмечены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Любое средство, применяемое интравагинально, может снижать спермицидное действие препарата. Действующее вещество – бензалкония хлорид, разрушается мылом, поэтому запрещается использование мыла для туалета половых органов, даже в минимальных количествах.

Особые указания

Фарматекс является эффективным препаратом для предохранения от беременности при условии его правильного применения. Однако, метод спермицидной местной контрацепции всегда менее эффективен, по сравнению с гормональной контрацепцией, внутриматочными контрацептивами, диафрагмой, цервикальным колпачком или презервативом.

Запрещается использование мыла для туалета половых органов за 2 часа до и 2 часа после полового акта, т.к. мыло разрушает действующее вещество препарата Фарматекс.

Туалет наружных половых органов возможен только простой водой для обоих партнёров. Влагалищное орошение (спринцевание) может применяться не раньше, чем через 2 часа после полового акта.

С препаратом Фарматекс, введенным во влагалище, нельзя принимать ванны и купаться в море, бассейне и водоемах во избежание снижения его контрацептивного действия.

При необходимости лечения препаратами для вагинального применения следует временно прекратить использование препарата Фарматекс до окончания курса лечения.

Данный метод контрацепции не защищает от инфекций, передающихся половым путем или вызванных вирусом иммунодефицита человека. От этих заболеваний есть только один метод барьерной контрацепции – презерватив.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные.

По 5 суппозиторияев в стрип из ПВХ пленки, покрытой полиэтиленом низкой плотности. 1 или 2 стрипа с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Наименование держателя (владельца) РУ:

Лаборатория Иннотек Интернасиональ

22, авеню Аристид Бриан, 94110 Аркей, Франция

Производственные площадки:

Производство готовой лекарственной формы, фасовка, упаковка

1. Иннотера Шузи

Рю Рене Шантеро, Шузи-сюр-Сис, Валуар-сюр-Сис, 41150, Франция

2. Юнитер Ликвид Мануфэчуринг

1-3 алле де ля Нест, промышленная зона Ан-Сигал 31770 Коломье, Франция

Выпускающий контроль качества

Иннотера Шузи

Рю Рене Шантеро, Шузи-сюр-Сис, Валуар-сюр-Сис, 41150, Франция