

FLETUDHËZUES NË PAKO: Informacion për përdoruesin

PHLEBODIA 600 mg, Tabletë e veshur me film
Diosmin

Lexoje me kujdes gjithë fletudhëzuesin përpara se të merni këtë bar sepse përmban informacion të rëndësishëm për ju

Përdoreni gjithmonë këtë bar ashtu si është përshkruar në këtë fletudhëzues ose si ja u ka rekomanduar mjeku.

- Ruajeni këtë fletudhëzues. Mund të duhet ta lexoni sërish
- Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Nëse keni ndonjë efekt anësor tregojini mjekut ose farmacistit tuaj, përfshirë dhe efektet anësore që janë të renditura në këtë fletudhëzues. Shiko paragrafin 4.
- Duhet të flisni me mjekun tuaj nëse nuk ndiheni mirë ose ndiheni më keq
Mos e lini këtë bar që të arrihet nga fëmijët.

Përmbajtja e këtij fletudhëzuesi :

1. Çfarë është PHLEBODIA 600 mg dhe përse përdoret?
2. Çfarë duhet të dini përpara se të përdorni PHLEBODIA 600 mg?
3. Si ta përdorni PHLEBODIA 600 mg?
4. Efekte anësore të mundshme?
5. Si ta ruani PHLEBODIA 600 mg?
6. Përmbajtja e pakos dhe informacione të tjera

1. ÇFARË ËSHTË PHLEBODIA 600 mg DHE PËRSE PËRDORET?

Grupi Farmakoterapeutik: VAZOPROTEKTIV/ AGJENT STABILIZUES I KAPILARËVE, kodi ATC: C05CA03 (sistemi kardiovaskular).

Ky bar është një ngushtues i enëve të gjakut (rrit tonicitetin e mureve të venave) dhe vazoprotektiv (rrit rezistencën e enëve të vogla të gjakut).

Rekomandohet për :

- Çregullime të qarkullimit të gjakut (*këmbë të rënduara , dhimbje , shqetësim në pozicionin shtrirë*),
- Krizë të hemorroideve .

2. ÇFARË DUHET TË DINI PËRPARA SE TË PËRDORNI PHLEBODIA 600 mg?

MOS PËRDORNI PHLEBODIA 600 MG, TABLETË E VESHUR ME FILM :

- Nëse jeni alergjik (I mbindjeshëm) ndaj diosminës ose ndonjë përbërësi tjetër të renditur në paragrafin 6;
- Bari në përgjithësi nuk rekomandohet gjatë ushqyerjes me gji.

Paralajmërime dhe masa paraprake

Flisni me mjekun ose farmacistin tuaj përpara se të përdorni PHLEBODIA 600 mg, tabletë e veshur me film.

Paralajmërime të veçanta

Nëse problemet dhe brishtësia e enëve të gjakut nuk zvogëlohen brënda 15 ditëve , konsultohuni me mjekun tuaj.

Nëse shqetësimet e hemorroideve vazhdojnë dhe mbas disa ditëve me trajtim , është e nevojshme të konsultoheni me mjekun tuaj.

Përkujdesje për përdorimin

Ky bar është më efektiv nëse kombinohet dhe me një stil jetese të shëndetshme.

Shmangni ekspozimin kundrejt rrezeve të dritës dhe nxehtësisë , qëndrimin e zgjatur në këmbë dhe shtimin mbi peshë. Ecja si dhe përdorimi i çorapeve të përshtatshme ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut

Ky bar përmban një agjent azo (kokineal e kuqe A) dhe mund të shkaktojë reaksion alergjik.

Fëmijët

Nuk është e aplikueshme

Barna të tjera dhe PHLEBODIA 600 mg, tabletë e veshur me film

Tregojini mjekut ose farmacistit tuaj nëse keni përdorur së afërmi apo jeni duke përdorur ndonjë bar tjetër.

PHLEBODIA 600 mg, tabletë e veshur me film dhe ushqimi

Nuk është e aplikueshme

Shtatzënia, ushqyerja me gji dhe fertiliteti

Nëse jeni shtatzanë ose ushqeni me gji fëmijën , apo nëse planifikoni të ngeleni shtatzanë , pyesni mjekun ose farmacistin tuj përpara se ta përdorni këtë bar.

Shtatzënia

Ky bar nuk duhet të përdoret gjatë shtatzanisë mund të përdoret vetëm në rastet kur ja u këshillon mjeku.

Nëse zbuloni se jeni shtatzënë gjatë trajtimit , pyesni mjekun tuaj nëse ju mund ta vazhdoni mjekimin

Ushqyerja me gji

Meqenëse nuk ka të dhëna nëse ky bar kalon në qumështin e gjirit , ky trajtim nuk rekomandohet gjatë ushqyerjes me gji.

Ngarja e makinës dhe përdorimi i makinerive

Nuk është e aplikueshme .

PHLEBODIA 600 mg, tabletë e veshur me film përmban kokineal e kuqe A.

3. Si ta përdorim PHLEBODIA 600 mg, tabletë e veshur me film ?

Gjithmonë merrni këtë mjekim ekzaktësisht si është përshkruar në fletudhëzues ose si ju ka rekomanduar mjeku . Kontrolloni me mjekun ose farmacistin tuaj nëse nuk jeni i sigurt.

Doza e rekomanduar është :

- Çrregullime të qarkullimit të gjakut: 1 tabletë në ditë , në mëngjes përpara se të hani mëngjes
- Hemorroidet : 2 to 3 tablets në ditë gjatë vakteve.

 Rruga e marrjes, nga goja

Merrni tabletën me një gjysëm gote uji.

Nëse merrni PHLEBODIA 600 mg, tabletë e veshur me film më shumë sesa duhet

Nuk është e aplikueshme

Nëse harroni të merrni PHLEBODIA 600 mg, tabletë e veshur me film

Nuk është e aplikueshme

Nëse ndaloni të merrni PHLEBODIA 600 mg, tabletë e veshur me film

Nuk është e aplikueshme

Nëse keni pyetje të tjera në lidhje me përdorimin e këtij bari pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si të gjitha barnat, ky bar mund të shkaktojë efekte anësore, ndonëse jo tek të gjithë përdoruesit.

Mund të shkaktojë çrregullime të vogla të tretjes, rrallë mund të çojë në ndërprerjen e trajtimit

Raportimi i efekteve anësore

Nëse keni ndonjë efekt anësor, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj. Kjo është e vlefshme dhe për ndonjë efekt anësor që nuk është e përfshirë në këtë fletudhëzues. Ju mund të raportoni direkt efektet anësore në sistemi e raportimit : Agjencia Kombëtare e Francës për barnat dhe sigurinë e Shëndetit (ANSM) si dhe tek Qendra Rajonale e Farmakovigjilencës në faqen zyrtare -Website: www.ansm.sante.fr

Duke raportuar efektet anësore ju ndihmoni në sjelljen e më shumë informacioneve në lidhje me sigurinë e këtij bari

5. SI TA RUANI PHLEBODIA 600 mg, tabletë e veshur me film?

Mbajeni larg këtë bar nga fëmijët.

Mos e përdorni këtë bar mbas datës së skadimit të vendosur në etiketë. Data e skadimit i referohet ditës së fundit të muajit.

bari nuk duhet të hidhet në plehërat e shtëpisë dhe as në lavaman. Pyesni mjekun ose farmacistin tuaj se ku duhet ta hidhni barin nëse nuk nevojitet përdorimi i tij. Këto masa ndihmojnë në ruajtjen e mjedisit.

6. PËRMBAJTJA E PAKOS DHE INFORMACIONE TË TJERA

Çfarë përmban PHLEBODIA 600 mg, tabletë e veshur me film

- lënda aktiv është :
Diosminë (e shprehur si anhidër dhe si diosminë e pastër) 600 mg
Për një tabletë të veshur.
- Përbërësit e tjerë janë :
Talk, silic koloidal anhidër hidro, acid stearik i mikronizuar, celulozë mikrokristilane

Veshja me film: hipromelozë, celulozë mikrokristaline, makrogol, stearat 400, propilenglikol, dioksid titani, kokineal e kuqe A, llak alumini, oksid hekuri I zi, oksid hekuri I kuq, dyllë nga palma karnauba, dyllë blete, llak, alkool 95°.

Si duket PHLEBODIA 600 mg, tabletë e veshur me film dhe përmbajtja e pakos

Ky bar është një tabletë e veshur me film. Kuti x 15 ose 30.

Mund të mos jenë të tregëtuara të gjitha paketimet.

Mbajtësi i autorizimit për tregë im

LABORATOIRES INNOTHERA
22 AVENUE ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL

Prodhuesi

INNOTHERA CHOUZY
RUE RENE CHANTEREAU
41150 CHOUZY SUR CISSE

Emrat e këtij medikamenti në Shtetet Anëtare të EEA

Nuk është e aplikueshme

Ky fletudhëzues është rishikuar në :

Janar 2018

Të tjera

Informacion më i hollësishëm është i disponueshëm në faqen zyrtare elektronike të ANSM (France).