

Хэрэглэх заавар
ПОЛИЖИНАКС

Бүртгэлийн дугаар: F971212GP00190

Худалдааны нэршил: ПОЛИЖИНАКС

Олон Улсын Нэршил: Неомицин + Нистатин + Полимиксин Б

Эмийн хэлбэр: Утгаагийн хэрэглэх капсул

Найрлага: 1 капсулд:

Үйлчилгэч бодис:

Неомицин сульфат..... 35000 МЕ

Полимиксин Б сульфат 35000 МЕ

Нистатин 100000 МЕ

Туслах бодис: Тифоз 63®-125,0 мг, усжуулсан шар буургийн тос 30,0 мг, диметикон 1000 - 2500,0 мг

Бүрхүүгийн найрлагад желатин 381,2 мг, глицерол 191,5 мг, диметикон 1000-86,9 мг орно.

Гаадал байдал: Цайвар шаргал өнгийн, зууван хэлбэрийн, зөвлөн капсулд нэг төрлийн бүтэцтэй, тосорхог, хагас шингэн агуулагдана. Капсулын агууламж нь шаргал эсвэл хүрэн өнгтэй байж болно.

Эмийн эмчилгээний бүлэг:

Ниймэлэй антибиотик (антибиотик: аминогликозид + полиен + цагирагт полипептид)

АТХ код: G01AA51

Эм судалын онцлог

Фармакодинамик. Хосолсон эмийн ўйлдэл нь түүнийг бүрэлдүүлэгч бүрэлдэхүүн хэсэг болж байна. Энэ нь бактерийн эсрэг, няягийн эсрэг болон мөөгнөнцөрийн эсрэг ўйлдэл үзүүлнэ. Неомицин болон полимиксин Б нь төрөл бүрүүн грам серог болон грам эсрэг бичил биетнүүдэд идэвхийт нөлөөлнэ; Streptococcus spp. болон анаэроб бактеруудад мэдрэг биш. Нистатин нь кандида төрлийн мөөгнөнцөрийг устахаа ўйлчилгээтэй. Утгаагийн салст бүрхүүвчийн тэжээлийг сайжруулна.

Фармакокинетик. Утгаагийн салст бүрхүүвчээр жигд тархан, хэсэг газарт мөөгнөнцөр болон няяг үхүүлэх үйлчил үзүүлнэ. Утгаагийн салстадаар барал шимгэдэгч.

Хэрэглэх заалт

Эмчилгээний зорилгоор

• Өвөрмөц бус мөөгнөнцөр ба мөөгнөнцөр, няягийн холимог вагинит, вульвовагинит, цервикинагинит;

Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор

• Бэлэг эрхтэний ормын мэс ажилбар хийхийн өмнө

• Уайн хүзүүнд диатермоагуляци хийхийн өмнө болон дараа

• Уайн хөндийд оношлогоо ажилбар хийхийн өмнө

• Төрөхийн өмнө

Хориглох заалт: Бэлдмэлийн найрлага дахь аль нэг бодист хэт мэдрэг хүмүүс хэрэглэхийг хориглоно. Жирэмсний эхийн 3 сар хэрэглэгчтэй.

Жирэмсэн болон хохул үед: Жирэмсний 2-3 сард зөвхөн эмчийн заавраар хэрэглэн. Хөхул үед эсрэг заалттай: нэн шаардлагатай тохиолдолд хөхөр хооллоох зогсох хэрэгтэй.

Хэрэглэх арга тун: Дээш харан хэвтэн унтахын өмнө 1 капсулыг утреэнд гүн хийнэ. Нэг курс эмчилгээ нь 12 хоног, урьдчилан сэргийлэх курс нь 6 хоног үргэлжилнэ. Нэг эсвэл хэд хэдэн удаа хэрэглэхээ марктан бол эмчилгээг ердийн тунгаар үргэлжлүүлнэ.

Гаж нөлөө:

Бэлдмэлийн найрлага дахь аль нэг бодист харшилын урвал илэрх болзошгүй. Улан хутгаагаар хэрэглэх үед аминогликозидын гаж нөлөө илрэх магадлалтай. Эмийн зааварт тусгагдсан гаж нөлөөний аль нэг нь хүндэрч, бусад зааварт ороогүй гаж нөлөө илрэх юм бол эмчид хандана уу.

Бусад эмийн бэлдмэлүүдтэй харилцан нөлөөлөл:

Спермицид нь бэлдмэлүүний идэвхийт бууруудаг тул хамт хэрэлхгүй байх.

Анихааруулга:

Бэлдмэлийн хэрэглэхийн өмнө няягийн шинжилгээнд хамрагдсан байх хэрэгтэй. Дахин халдварт авах эрэдэл болон өвчин үүсгэгчид тээвртэй болохос бол урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэх хутгацаа хэзгаарлана. Эмчилгээний явцад латексаар хийсэн бэлэгч болон уайн хузуүний хаалт хэрэглэхийг байх, сарын тэмдгийн үед засварлах шаардлагагүй.

Тээврийн хэрэгслийг жолоод хадварт нөлөөлөх

Тээврийн хэрэгслийг жолоод хадварт нөлөөлжэхгүй.

Савалт: Нэг блистер (поливинилхлорид болон хөнгөнцагааны) 6 утреэнд капсул дахь 1 хайцагт 1 эсвэл 2 блистер, хэрэглэх зааврын хамт савалгдсан.

Хадгалах нохцэл: Хүхэрэд хүрэхгүй газар, 25 °C-с ихгүй хэмд хадгалана.

Хадгалах хугацаа: 2 жил. Хайрцаган дээр заасан хугацаа дууссанасаа хойш хэрэлж болохгүй.

ЭМЙИН САНГААС ЖОРООР АЛГОНО.

Олон Улсын Иннотек Лаборатори

22, авеню Аристид Бриан, 94110 Аркей, Франц.

Иннотера Шүзи-д үйлдвэрлэв

Рю Рене Шанторо, Шүзи-сюр-Сис, Валуар-сюр-Сис, 41150, Франц.

Орос дахь төлөөлгүүг

АО «Лаборатори Иннотек Интернасиональ» (Франц):

127051, г. Москва, ул. Петровка, д.20/1,

угас.: (495) 775-41-12, факс: (495) 287-87-68

e-mail: innotech@innotech.ru

www.innotech.ru

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi

Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E.M.Ağayev

“_03_” oktyabr 2018-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

POLİJİNAKS

vaginal kapsullar

POLYGYNAX

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Neomycin + Nystatin + Polymyxin B

Tərkibi

Təsireddi maddə: 1 kapsulda 35000TV neomisin sulfat, 35000 TV polimiksin B sulfat, 100000 TV nistatin vardır.

Köməkçi maddələr: tefoz 63, hidrogenlaşdırılmış soyaya yağı, dimetikon.

Kapsulun örtüyü: jelatin, qliserin, dimetikon.

Təsviri

Açıq-sarı rəngli və oval formalı yumşaq kapsullar olub, bircinsli yarımduru və yağılı kütlədən ibarətdir. Kapsulun möhtəviyyatı sarı rəngdən qəhvəyi rəngə qədər dəyişə bilər.

Farmakoterapeutik qrupu.

Kombinolunmuş antibiotikdir (antibiotiklər: aminoqlikozid + polien + siklik polipeptid).

ATC kodu: G01AA51

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Tərkibindəki komponentlər görə təsir göstərən kombinolunmuş preparatdır.

Antibakteriyal, bakterisid və göbələkaleyhinə təsir göstərir. Neomisin və polimiksin B bir çox gramməni və gramməsbət mikroorganizmlərə qarşı aktivdir; Streptococcus spp. və anaerob bakteriyalar bu antibiotiklərlə qarşı həssas deyildir. Nistatin Candida cinsindən olan göbələklərə qarşı funksidə təsir göstərir. Uşaqlıq yoluñun selikli qışasında trofikani yaşıylıdır.

Farmakokinetikası

Uşaqlıq yoluñun selikli qışasına bərabər yayılaraq bakterisid və funksidə təsir göstərir. Uşaqlıq yoluñun selikli qışasından praktiki olaraq sorulmur.

İstifadəsinin göstərişlər

Müalicə

İnfeksiyon-lithabı xəstəliklər (hassas mikroorganizmlər tərəfindən təradilən): qeyri-spesifik, göbələk, qarışq vaginitlər, vulvovaginitlər və servikovaginitlər.

Profilaktika

- Ginekoloji əməliyyatlarda infeksiyon ağrılaşmaların profilaktikası məqsədilə carriahi müdaxiləndən əvvəl;

- uşaqlıq boynu diatermokoaoqulyasiyasından əvvəl və sonra

- uşaqlıqdaxili diaqnostik proseduraldan əvvəl

- doğuşdan əvvəl.

Əks göstərişlər

Preparatın işlənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq. Hamiləliyin I trimestri.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Preparatın qəbulundan önce yaxma götürür və bakterioloji analiz aparılır. Preparatın istifadə müddəti davamlı stəmmərin yaranmasının və təkrar infeksiya riskinin qarşısının alınması məqsədilə seçilir.

Müalicə müddəndən əlavəksən hazırlanmış qapaq və prezervativlərdən istifadə etmək olmaz.

Aybəsi zamanı müalicə davam etdirilməlidir.

Digər dərman vasitələrlə qarşılıqlı təsiri

Spermisidlərlə birgə istifadə məsləhət görülmür, preparatın aktivliyini aşağı sala bilər.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləliyin II və III trimestrində preparat ana üçün gözlənilən fayda döll üçün potensial riskən üstün olduğu halda ehtiyatla istifadə edilsə bilər. Laktasiya dövründə preparatın istifadəsi aks göstərişdir. Laktasiya dövründə preparatın istifadəsi zorlu olsarsa, ana südű ilə qidalandırmanı dayandırmış lazımdır.

İstifadə qaydası və dozasi

Vaginal istifadə üçündür. Axşam yuxudan qabaq arxası üstə uzanmış vəziyyətdə uşaqlıq yoluñ dərinə yeridilir.

Müalicə kursu 12 gündür. Profilaktik kurs 6 gündür. Bir və ya bir neçə dozanın istifadəsi bura-xilarsa və ya unudularsa, müalicə adı doza rejimi ilə davam etdirilməlidir.

Nəqliyyat vasitələrinin və digər potensial təhlükəli məxanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri
Nəqliyyat vasitələrinin və digər potensial təhlükəli məxanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə mənfi təsiri barədə heç bir məlumat yoxdur.

Əlavə təsirləri

Allergik reaksiyalar: göynəmə, qaşınma, uşaqlıq yolunun qıcıqlanması. Allergik kontakt ekzema.

Uzun müddət istifadə etdikdə aminoqlikozidlərin əlavə təsirlərinin sistem təzahürleri meydana çıxa bilər.

Göstərilən əlavə təsirlərdən hər hansı biri ağrılaşarsa, yaxud bu içlik vərəqədə göstərilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkimi məlumatlaşdırmaq lazımdır.

Doza həddinin aşılması

Heç bir məlumat yoxdur.

Buraxılış forması

Vaginal kapsullar. 6 kapsul, alüminium blisterde. 1 və ya 2 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılmışdır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən aşağı temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdiğindən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şartı

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

Innotech İnternasional Laboratoriya.

22 avenuy Aristid Brian, 94110 Arkey, Fransa.

İstehsal edilir

Innotech Şizi.

Ryu Rene Şantero, Şuzi-Sür-Sis, Valuar-sür-Sis, 41150, Fransa.

Rusiya nümayəndəliyi

AO "Innotech İnternasional laboratoriysi" (Fransa).

127051, Moskva şəhəri, Petrovka küçəsi, ev 20/1.

Tel. : (495)775-41-12, faks (495)287-87-68.

e-mail:innotech@innotech.ru

www.innotech.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ПОЛИЖИНАКС

Регистрационный номер: П N011782/01

Торговое название: ПОЛИЖИНАКС

Группировочное название:

Неомицин + Нистатин + Полимиксин В

Лекарственная форма: капсулы вагинальные

Состав на 1 капсулу

Действующие вещества:

Неомицина сульфат..... 35 000ME

Полимиксина В сульфат 35 000ME

Нистатин 100 000ME

Вспомогательные вещества: тefoz 63° – 125,0 mg; соевое масло

гидрогенизированное – 30,0 mg; диметикон 1000 – до 2500,0 mg

Состав оболочки капсулы: желатин – 381,2 mg; глицерол – 191,5 mg;

диметикон 1000 – 86,9 mg

Описание

Мягкие капсулы от светло-желтого до бежевого цвета, овальной формы, содержащие полужидкую однородную массу. Содержимое капсул может иметь цвет от желтого до коричневого.

Фармакотерапевтическая группа

Антибиотик комбинированный.

(антибиотики: аминогликозид + полиен + циклический полипептид)

Код ATХ: G01AA51

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Оказывает антибактериальное, бактерицидное и противгрибковое действие. Неомицин и полимиксин В активны в отношении многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов; *Streptococcus* spp. и анаэробные бактерии, нечувствительны к этим антибиотикам. Нистатин оказывает фунгицидное действие в отношении грибов рода *Candida*.

Улучшает трофические процессы в слизистой влагалища.

Фармакокинетика. Равномерно распределяется по слизистой влагалища, оказывая местное бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой влагалища.

Показания для применения

Лечение.

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами: неспецифические, грибковые, смешанные вагиниты, вульвовагиниты и цервиковагиниты.

Профилактика.

- Предоперационная профилактика инфекционных осложнений при гинекологических вмешательствах;
- до и после диатермоагуляции шейки матки;
- перед внутриматочными диагностическими процедурами;
- перед родами.

Противопоказания для применения

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.

I trimestr bəremenniyyəti.

Беременность и грудное вскармливание

Применение в период беременности во II и III триместрах возможно только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Период лактации является противопоказанием; при необходимости использования препарата в данный период, кормление грудью прекращают.

Способ применения и дозы

Для вагинального применения.

Лежа на спине, капсulu vəvodat vəragalişce vəcherom pərəd sənəm.

Kurs lecheniya 12 dñey. Profilakticheskiy kurs b dñey.

B sluchae propuska v prieme odnoi ili nekolikikh kapsul vobzobnovite priem preparkata v obychnoi doze.

Побочные действия

Allergergicheskie reakcii, zhjennie, zd, razdrажenije vo vragališce. Allergergicheskaya kontaktnaya ekzema. Pri dlitel'nom primeneniye vozmožno sistemicheskoye proyavleniye pobochnykh deystviy aminoglikozidov.

Eсли любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Ne rekomeneduyetsya ispol'zovat v sochetanii so spermiyidami, t.k. vozmožno snizhenie aktivnosti preparkata.

Особые указания

Perejd primenieniem preparkata neobodimno predvaritel'noe vzyatie maska i privedenie bakteriologicheskogo analiza.

Srokki primenieniya preparkata dolzhny byt ograniccheni s tselyou preduprezhdeniya formirovaniya ustoychivosti k nemu otdelnykh vozбудiteley zabolевaniy i riska reinfekcii.

Bo vremya lecheniya ne rekomeneduyetsya ispol'zovat kolpachki i prezervativy iz latexa.

Ne sleduet preryvati kurss lecheniya bo vremya menstruacii.

Передозировка

Net dannyx.

Влияние на способность управлять транспортными средствами

Net dannyx ob otricatel'nom vliyaniye preparkata na sposobnost upravlyat transportnymi sredstvami i drugimi mehanizmami.

Форма выпуска

Kapsulu vagonalnye.

Po 6 kapsul v PVC/PVDF alumininiye blisterye.

Po 1 ili 2 blistera s instruktsiyoy po primenieniu v kartonnoy pakke.

Условия хранения

Xranit pri temperaturye ne vyshye 25 °C.

Xranit v nedostupnom dlya detej meste.

Срок годности

2 goda. Ne ispol'zovat po istecheniiu sroka godnosti, uzyannego na upakovke.

Условия отпуска из аптек

Po rezeptu.

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:

Laboratoriya Innotech Internasional

22, avenuy Aristid Briam, 94110 Arkay, Fransiya

Производитель (первичная и вторичная упаковки, выпускающий

контроль качества):

Innotech Shuzi

Rio Rene Shantero, Shuzi-sior-Sis, Valuar-sior-Sis, 41150, Fransiya